



УДК 595.44(470.67)

СОСТАВ И ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПАУКОВ (ARANEI) РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

© 2009. **Абдурахманов Г.М., Алиева С.В.**
Дагестанский государственный университет

В статье даются итоги изучения фауны и географического распространения пауков Дагестана. К настоящему времени состав фауны пауков включает 25 семейств, 103 рода, 200 видов, из которых для Дагестана впервые отмечено 98 видов, а два вида описаны как новые для науки (*Drassodes dagestanus* sp.n. и *Drassodes archibensis* sp.n. [5].)

There are the results of studying fauna and geographical spreading of the spiders of Dagestan. Now the fauna of spiders consists of 25 families, 103 genus and 200 species, from which 98 species are noted for Dagestan for the first time, and 2 species are described as new for the science. (*Drassodes dagestanus* sp.n. и *Drassodes archibensis* sp.n. [5].)

Ключевые слова: пауки, вид, Дагестан, район

Key words: spiders, species, Daghestan, district

Несмотря на то, что пауки представляют собой группу многочисленных и имеющих огромное значение животных, которые до сих пор еще сравнительно слабо изучены, во многих регионах фауна их остается нетронутой. Одним из таких регионов является Дагестан. В процессе личных сборов авторов и обработки коллекционных материалов, хранящихся в различных научных, учебных заведениях, для территории Дагестана составлен список из 200 видов пауков, принадлежащих 103 родам и 25 семействам. Самым многочисленным семейством в видовом отношении является Lycosidae (38 видов), далее семейство Linyphiidae (27 видов) и семейство Thomisidae (20 видов). По 19 видов в семействах Theridiidae и Gnaphosidae.

Среди сборов есть интересные находки: *Pseudeuophrys lanigera* (Simon, 1871) – отмечен впервые для фауны России; *Agroeca maculatan* L.Koch, 1879 – ранее самая западная находка была в Казахстане; *Achaearanea simulans* (Thorell, 1875) – вид космополит, характерен для тропиков; *Huptyotes paradoxus* (C.L.Koch, 1834) – является редким.

Аннотированный список видов, приводится по К.Г. Михайлову (1997). [3]

СЕМЕЙСТВО PHOLCIDAE

Род *Pholcus* Walckenaer, 1805. На территории бывшего СССР известно 11 видов. В Дагестане к настоящему времени обнаружено 2 вида:

Pholcus alticeps Spassky, 1932. Дагестан: 25 км СЗ Буйнакса, окр. с. Эрпели (Пономарёв, Халидов, 2007). [2]

Pholcus ponticus Thorell, 1875. Дагестан: 15 км З Буйнакса, окр. с. Верхнее Казанище (Пономарёв, Халидов, 2007)

СЕМЕЙСТВО DYSDERIDAE

Род *Dysdera* Latreille, 1804 включает 51 вид. В Дагестане встречаются 3 вида:

Dysdera azerbaijdzhanica Charitonov, 1956. Дагестан: западные окр. Дербента (Дунин, 1992).

Dysdera daghestanica Dunin, 1991. Дагестан: 2 ♀, Цумадинский р-н, села Инхоквари, Хонх, Хварши, июнь – июль 1991, Г.М. Абдурахманов; 1 ♂, Чародинский р-н, с. Арчиб, июнь – июль 1991, Г.М. Абдурахманов; 1 ♀, 2 ♂, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В.Алиева; 1 ♀, Махачкала 2002, С.В. Алиева; 40 км юго-западнее Дербента, с. Хучни (Дунин, 1991а)



Dysdera incognita ?. Дагестан: 2 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2004, С.В. Алиева. Замечания. Вид *D. incognita* характерен для западного Кавказа, где обитает в предгорьях (Дунин, 1992). Недавно был обнаружен в Ростовской области (Пономарёв, Цветкова, 2003). Наши экземпляры несколько отличаются от описания, сделанного П.М. Дуниным (1991). Не исключено, что мы имеем новый, близкий к *D. incognita* вид.

Род *Harpactea* Bristowe, 1939 включает 36 видов. В Дагестане встречается 2 вида:

Harpactea indistincta Dunin, 1991. Дагестан: Самурский р-н, Гарах, (Дунин, 1991б).

Harpactea modesta Dunin, 1991. Дагестан: 40 км юго-западнее Дербента, с. Хучни (Дунин, 1991б).

СЕМЕЙСТВО ERESIDAE

Род *Eresus* Walckenaer, 1805 включает 2 вида. В Дагестане встречается 1 вид:

Eresus cinnaberinus (Oliver, 1787). Дагестан: 1 ♀, Унцукульский р-н, с. Майданское, июль 2002, С.В. Алиева.

СЕМЕЙСТВО ULOBORIDAE

Род *Huptyotes* Walckenaer, 1837 включает 2 вида. В Дагестане встречается 1 вид:

Huptyotes paradoxus (C.L.Koch, 1834). Дагестан: 1 ♀, Унцукульский р-н, Ирганай сад, июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов.

СЕМЕЙСТВО THERIDIIDAE

Род *Achaearanea* Strand, 1929 включает 6 видов. В Дагестане встречаются 3 вида:

Achaearanea lunata (Clerck, 1758). Дагестан: 2 ♀, Унцукульский р-н, Ирганай сад, июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов; 5 ♀, Дербентский р-н, с. Аглоби, июнь 2004, С.В. Алиева, Буйнакский р-н, с. Верхнее Казанище, окр. с. Верхний Каранай (Пономарёв, Халидов, 2007).

Achaearanea simulans (Thorell, 1875). Дагестан: 26 ♀, 2 ♂, Унцукульский р-н, Ирганай сад, июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов.

Achaearanea tepidariorum (C.L. Koch, 1841). Дагестан: Буйнакский р-н, 25 км СЗ Буйнак-ска, окр. с. Эрпели, с. Верхнее Казанище (Пономарёв, Халидов, 2007).

Род *Enophlognatha* Pavesi, 1880 включает 13 видов. В Дагестане встречаются 5 видов:

Enophlognatha diversa (Blackwall 1859). Дагестан: 2 ♀, Ахтынский р-н, с. Куруш, июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов.

Enophlognatha latimana Hippa et Oksala, 1982. Дагестан: 1 ♀, Ахтынский р-н, с. Куруш, июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов; 1 ♀, Унцукульский р-н, Ирганай сад, июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов; 6 ♂, 1 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева. Чеченская республика: 1 ♀, с. Итум-Кале, июль 1989, Г.М. Абдурахманов.

Enophlognatha oelandica (Thorell, 1875). Дагестан: 1 ♀, Чародинский р-н, с. Арчиб, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов; 3 ♀, Ахтынский р-н, с. Куруш, июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов, Буйнакский р-н, с. Верхнее Казанище (Пономарёв, Халидов, 2007).

Enophlognatha ovata (Clerck, 1758). Дагестан: 1 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2004, С.В. Алиева. Чеченская республика: 4 ♂, с. Ведичи, Июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов; 2 ♂, с. Итум-Кале, июль 1989, Г.М. Абдурахманов.

Enophlognatha sp. группы *ovata*. Дагестан: 1 ♀, Ахтынский р-н, с. Куруш, июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов; 2 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева, Чеченская республика: 1 ♀, с. Ведичи, Июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов.

Род *Latrodectus* Walckenaer, 1805 включает 4 вида. В Дагестане встречается 1 вид:

Latrodectus tredecimguttatus (Rossi, 1790). Дагестан, Терско-Ногайские степи, Табасаран, Ахты, (Россигов, 1904); Кизляр, (Мориц, 1914); о. Чечень, (Пономарёв, Халидов, 2007).

Род *Robertus* O. Pickard-Cambridge, 1879 включает 14 видов. В Дагестане встречается 1 вид:

Robertus arundineti (O.Pickard-Cambridge, 1871). Дагестан: 1 ♀, Ахтынский р-н, с. Куруш, июнь-июль 1991, Абдурахманов Г.М.

Род *Steatoda* Sundevall, 1833 включает 12 видов. В Дагестане встречаются 5 видов:

Steatoda albomaculata (De Geer, 1778). Дагестан: 3 ♀, Ахтынский р-н, с. Куруш, июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов; 1 ♀, Унцукульский р-н, с. Майданское, июль 2002, С.В. Алиева; 1 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева.



Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758). Дагестан: 1 ♀, Махачкала 2004, С.В. Алиева.

Steatoda castanea (Clerck, 1758), Буйнакский р-н, окр. с. Эрпели, с. Верхнее Казанище (Пономарёв, Халидов, 2007).

Steatoda phalerata (Panzer, 1801). Дагестан: 11 ♀, 2 ♂, Ахтынский р-н, с. Куруш, июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов; 3 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, Алиева С.В.; 1 ♀, Махачкала 2004, С.В. Алиева.

Steatoda paykulliana (Walckenaer, 1806). Дагестан: 1 ♀, Ахтынский р-н, с. Куруш, июнь-июль 1991, Абдурахманов Г.М.; 5 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева; 2 ♀, Махачкала 2002, Алиева С.В.; 1 ♀, Махачкала 2005, С.В. Алиева, Буйнакский район, окр. с. Эрпели (Пономарёв, Халидов, 2007).

Род *Theridion* Walckenaer, 1805 включает 39 видов. В Дагестане встречаются 4 вида:

Theridion impressum L.Koch, 1881. Дагестан: 8 ♀, 1 ♂, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева.

Theridion nigrovariegatum Simon, 1873. Дагестан: Буйнакский р-н, окр. с. Верхний Каранай (Пономарёв, Халидов, 2007).

Theridion tinctum (Walckenaer, 1802). Дагестан: 1 ♀, Дербентский район, с. Аглоби, июнь 2004, С.В. Алиева.

Theridion pinastris L.Koch, 1872. Дагестан: 1 ♀, Унцукульский р-н, Ирганай сад, июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов.

СЕМЕЙСТВО LINYPHIIDAE

Род *Asthenargus* Simon et Fage, 1922 включает 4 вида. В Дагестане встречается 1 вид:

Asthenargus caucasicus Tanasevitch, 1987. Дагестан: Сергокала (Танасевич, 1987); долина р. Чирагчай, Сардакент (Танасевич, 1987); бассейн р. Самур, окр. с. Гарах (Танасевич, 1987).

Род *Centromerus* F.Dahl, 1886 включает 29 видов. В Дагестане встречается 1 вид:

Centromerus minor Tanasevitch, 1990. Дагестан: долина р. Самур, окр. с. Гарах. (Танасевич, 1981).[4]

Род *Diplocephalus* Bertkau in Forster et Bertkau, 1883 включает 20 видов. В Дагестане встречается 1 вид:

Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841). Дагестан: долина р. Чирагчай, Хив (Танасевич, 1987).

Род *Diplostyla* Emerton, 1882 включает 1 вид. В Дагестане встречается 1 вид:

Diplostyla concolor (Wider, 1834). Дагестан: долина р. Чираг-чай, Хив (Танасевич, 1987); Буйнакский район, окр. с. Эрпели (Пономарёв, Халидов, 2007).

Род *Entelecara* Simon, 1884 включает 8 видов. В Дагестане встречается 1 вид:

Entelecara acuminata (Wider, 1834). Дагестан: Верхний Гуниб (Танасевич, 1987).

Род *Gnathonarium* Karsch, 1881 включает 4 вида. В Дагестане встречается 1 вид:

Gnathonarium dentatum (Wider, 1834). Дагестан: долина р. Самур (Танасевич, 1987).

Род *Gongulidiellum* Simon, 1884 включает 3 вида. В Дагестане встречается 1 вид:

Gongulidiellum latebricola (O.Pickard-Cambridge, 1871). Дагестан: Леваша (Танасевич, 1987).

Род *Incestophantes* Tanasevitch, 1992 включает 13 видов. В Дагестане встречается 1 вид:

Incestophantes amotus (Tanasevitch, 1990). Дагестан: 1 ♂, Ахтынский р-н, с. Куруш, июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов.

Род *Lepthyphantes* Menge, 1866 включает 122 вида. В Дагестане встречаются 2 вида:

Lepthyphantes obscurus (Blackwall, 1841). Дагестан: Леваша (А.В. Танасевич, 1987) [4]

Lepthyphantes quadrimaculatus Kulczynski, 1898. Дагестан: долина р. Самура, окр. с. Гарах (Танасевич, 1987).

Род *Linyphia* Latreille, 1804 включает 7 видов. В Дагестане встречается 1 вид:

Linyphia hortensis Sundevall, 1830. Буйнакский р-н, окр. с. Верхнее Казанище (Пономарёв, Халидов, 2007).

Род *Mansuphantes* Saaristo & Tanasevitch, 1996 включает 13 видов. В Дагестане встречается 1 вид:



Mansuphantes parmatus (Tanasevitch, 1990). Дагестан: долина р. Самура, окр. с. Гарах (Танасевич, 1987).

Род *Metopobactrus* Simon, 1884 включает 2 вида. В Дагестане встречается 1 вид:

Metopobactrus prominulus (O. Pickard-Cambridge, 1872). Дагестан: Верхний Гуниб (Танасевич, 1987).

Род *Micrargus* F. Dahl, 1886 включает 4 вида. В Дагестане встречается 1 вид:

Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854). Дагестан: долина р. Чирагчай, Хив (Танасевич, 1987).

Род *Microlinyphia* Gerhardt, 1928 включает 2 вида. В Дагестане встречается 1 вид:

Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830). Дагестан: Буйнакский р-н, окр. с. Эрпели; окр. с. Верхнее Казанище; окр. с. Верхний Каранай (Пономарёв, Халидов, 2007).

Род *Microneta* Menge, 1869 включает 3 вида. В Дагестане встречается 1 вид:

Microneta viaria (Blackwall, 1841). Дагестан: долина р. Чирагчай, Хив (Танасевич, 1987).

Род *Nerienne* Blackwall, 1833 включает 14 видов. В Дагестане встречаются 4 вида:

Nerienne emphana (Walckenaer, 1841). Дагестан: Буйнакский р-н, окр. с. Эрпели; окр. с. Верхний Каранай, (Пономарёв, Халидов, 2007).

Nerienne montana (Clerck, 1758). Дагестан: Буйнакский р-н, окр. с. Верхний Каранай (Пономарёв, Халидов, 2007).

Nerienne peltata (Wider, 1834). Дагестан: Буйнакский р-н, окр. с. Верхний Каранай (Пономарёв, Халидов, 2007).

Nerienne radiata (Walckenaer, 1841). Дагестан: Буйнакский р-н, окр. с. Верхний Каранай (Пономарёв, Халидов, 2007).

Род *Pocadicnemis* Simon, 1884 включает 1 вид. В Дагестане встречается 1 вид:

Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841). Дагестан: Верхний Гуниб, Сергокала (Танасевич, 1987).

Род *Savignya* Blackwall, 1833 включает 12 видов. В Дагестане встречается 1 вид:

Savignya frontata Blackwall, 1833. Дагестан: Верхний Гуниб (Танасевич, 1987).

Род *Silometopus* Simon, 1926 включает 9 видов. В Дагестане встречается 1 вид:

Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1872). Дагестан: Буйнакский р-н, Улубий-аул (Танасевич, 1987).

Род *Stemonyphantes* Menge, 1866 включает 10 видов. В Дагестане встречается 1 вид:

Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758). Дагестан: Буйнакский р-н, окр. с. Верхний Каранай (Пономарёв, Халидов, 2007).

Род *Walckenaeria* Blackwall, 1833 включает 40 видов. В Дагестане встречаются 3 вида:

Walckenaeria antica (Wider, 1834). Дагестан: долина р. Чирагчай, Хив (Танасевич, 1987). [4]

Walckenaeria capito (Westring, 1861). Россия, Дагестан: Сергокала (Танасевич, 1987).

Walckenaeria monoceros (Wider, 1834). Дагестан: 2 ♀, Ахтынский район, с. Куруш, июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов.

СЕМЕЙСТВО TETRAGNATHIDAE

Род *Metellina* Chamberlin et Ivie, 1941 включает 5 видов. В Дагестане встречаются 2 вида:

Metellina segmentata (Clerck, 1758). Дагестан: 7 ♂, 5 ♀, Цумадинский р-н, села Инхоквари, Хонох, Хварши, Июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов; 1 ♀, Унцукульский р-н, с. Майданское, июль 2002, С.В. Алиева; 1 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева, Буйнакский р-н, окр. с. Верхний Каранай (Пономарёв, Халидов, 2007). Чеченская республика: 2 ♂, 1 ♀, с. Итум-Кале, июль 1989, Г.М. Абдурахманов.

Metellina sp. Дагестан: 1 ♀, Цумадинский р-н, села Инхоквари, Хонох, Хварши, Июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов.

Род *Pachygnatha* Sundevall, 1823 включает 4 вида. В Дагестане встречаются 3 вида:

Pachygnatha clercki Sundevall, 1823. Чеченская республика: 1 ♀, с. Ведичи, июнь-июль 1990, Абдурахманов Г.М.

Pachygnatha listeri Sundevall, 1830. Дагестан: 1 ♀, Цумадинский р-н, села Инхоквари, Хонох, Хварши, Июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов.



Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830. Дагестан: 1 ♂, Унцукульский р-н, Ирганай сад, июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов; 1 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева, Буйнакский р-н, окр. с. Эрпели; окр. с. Верхний Каранай, (Пономарёв, Халидов, 2007).

Род *Tetragnatha* Latreille, 1804 включает 17 видов. В Дагестане встречаются 4 вида:

Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758). Дагестан: 1 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева.

Tetragnatha montana Simon, 1874. Дагестан: 1 ♀, Магарамкентский р-н, Самурский лес, 5.06.1991, Г.М. Абдурахманов; 1 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева.

Tetragnatha obtusa C.L.Koch, 1837. Дагестан: 1 ♀, Ахтынский р-н, с. Куруш, июнь-июль 1991, Абдурахманов Г.М.

Tetragnatha nigrita Lendl, 1886. Дагестан: 1 ♂, Магарамкентский р-н, Самурский лес, 5.06.1991, Г.М. Абдурахманов.

СЕМЕЙСТВО ARANEIDAE

Род *Aculepeira* Chamberlin et Ivie, 1942 включает 8 видов. В Дагестане встречается 1 вид:

Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802). Дагестан: 1 ♀, Ахтынский р-н, с. Куруш, июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов; 1 ♂, 7 ♀, Чародинский р-н, с. Арчиб, июнь-июль 1990, Абдурахманов Г.М.; 1 ♂, 1 ♀, Цумадинский р-н, села Инхоквари, Хонох, Хварши, Июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов.

Род *Agalenatea* Archer, 1951 включает 1 вид. В Дагестане встречается 1 вид:

Agalenatea redii (Scopoli, 1763). Дагестан: 2 ♀, Унцукульский р-н, с. Майданское, июль 2002, С.В. Алиева; 1 ♀, Махачкала 2004, С.В. Алиева. Дагестан (Кронеберг, 1875)

Род *Araneus* Clerck, 1758 включает 44 вида. В Дагестане встречаются 5 видов:

Araneus angulatus Clerck, 1758. Дагестан: 1 ♀, Цумадинский р-н, села Инхоквари, Хонох, Хварши, Июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов; 4 ♀, Махачкала 2002, С.В. Алиева.

Araneus diadematus Clerck, 1758. Дагестан: 1 ♂, 9 ♀, Цумадинский р-н, села Инхоквари, Хонох, Хварши, Июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов; 1 ♂, 4 ♀, Махачкала 2002, С.В. Алиева; 3 ♀, Махачкала 2004, С.В. Алиева; 1 ♂, 4 ♀, Махачкала 2005, С.В. Алиева. Чеченская республика: 1 ♂, с. Итум-Кале, июль 1989, Г.М. Абдурахманов. Дагестан: Буйнакский р-н, с. Верхнее Казанище (Пономарёв, Халидов, 2007). [2]

Araneus marmoreus Clerck, 1758. Дагестан: 2 ♀, Цумадинский р-н, села Инхоквари, Хонох, Хварши, Июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов.

Araneus quadratus Clerck, 1758. Дагестан: 4 ♀, Цумадинский р-н, села Инхоквари, Хонох, Хварши, Июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов.

Araneus pallasi (Thorell, 1875). Дагестан: окрестности Кизляра (Мариковский, Марусик, 1985)

Род *Araniella* Chamberlin et Ivie, 1942 включает 6 видов. В Дагестане встречаются 2 вида:

Araniella cucurbitina (Clerck, 1758). Дагестан: 1 ♀, Цумадинский р-н, села Инхоквари, Хонох, Хварши, Июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов; 2 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева. Чеченская республика: 5 ♀, с. Ведичи, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов. Буйнакский р-н, окр. с. Эрпели; с. Верхнее Казанище, окр. с. Верхний Каранай (Пономарёв, Халидов, 2007).

Araniella opisthographa (Kulczynski, 1905). Дагестан: 1 ♀, Магарамкентский р-н, Самурский лес, 5.06.1991, Г.М. Абдурахманов. Чеченская республика: 6 ♀, с. Ведичи, июнь-июль 1990, Абдурахманов Г.М.

Род *Argiope* Savigny et Audouin, 1826 включает 3 вида. В Дагестане встречаются 2 вида:

Argiope bruennichi (Scopoli, 1772). Дагестан: 1 ♀, Махачкала 2002, С.В. Алиева; 3 ♀, Махачкала 2004, С.В. Алиева; 1 ♀, Махачкала 2005, С.В. Алиева.

Argiope sp. Дагестан: 1 ♀, Дербентский р-н, с. Аглоби, июнь 2004, С.В. Алиева. Замечание. Вид очень близок к распространенному на юге России виду *A. lobata* (Pallas, 1772), однако сильно отличается окраской и формой эпигины, что не позволяет отнести наш вид к *A. lobata*. Отсутствие в нашей коллекции самцов затрудняет точную диагностику указанной самки.



Род *Cyclosa* Menge, 1866 включает 8 видов. В Дагестане встречаются 2 вида:

Cyclosa conica (Pallas, 1772). Дагестан: Буйнакский район, с. Верхнее Казанище, окр. с. Верхний Каранай, (Пономарёв, Халидов, 2007).

Cyclosa sierrae Simon, 1870. Дагестан: 8 ♀, Дербентский р-н, с. Аглоби, июнь 2004, С.В. Алиева. Буйнакский р-н, с. Верхнее Казанище (Пономарёв, Халидов, 2007).

Род *Larinioides* Caporiacco, 1934 включает 6 видов. В Дагестане встречаются 1 вид:

Larinioides ixobolus (Thorell, 1873). Дагестан: 1 ♀, Махачкала 2004, С.В. Алиева.

Род *Mangora* O. Pickard-Cambridge, 1889 включает 1 вид. В Дагестане встречается 1 вид:

Mangora acalypha (Walckenaer, 1802). Дагестан: 2 ♀, Магарамкентский р-н, Самурский лес, 5.06.1991, Г.М. Абдурахманов; 4 ♀, Унцукульский р-н, с. Майданское, июль 2002, С.В. Алиева; 1 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2004, С.В. Алиева, Буйнакский р-н, окр. с. Эрпели, с. Верхнее Казанище, окр. с. Верхний Каранай (Пономарёв, Халидов, 2007). Чеченская республика: 3 ♀, с. Ведичи, июнь-июль 1990, Абдурахманов Г.М.

Род *Neoscona* Simon, 1864 включает 4 вида. В Дагестане встречается 1 вид:

Neoscona adianta (Walckenaer). Дагестан: 1 ♂, 14 ♀, Цумадинский р-н, села Инхоквари, Хонох, Хварши, Июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов; 1 ♀, Унцукульский р-н, с. Майданское, июль 2002, С.В. Алиева; 2 ♀, 4 ♂, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева; 1 ♀, Дербентский р-н, с. Аглоби, июнь 2004, С.В. Алиева; 1 ♀, Махачкала 2005, С.В. Алиева. Чеченская республика: 4 ♀, с. Итум-Кале, июль 1989, Абдурахманов Г.М.; 1 ♂, с. Ведичи, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов.

Род *Nuctenea* Simon, 1864 включает 2 вида. В Дагестане встречается 1 вид:

Nuctenea umbratica (Clerck, 1758). Дагестан: 1 ♂, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2004, С.В. Алиева.

Род *Zilla* C.L.Koch, 1834 включает 2 вида. В Дагестане встречаются 1 вид:

Zilla diodia (Walckenaer, 1802) Дагестан: Буйнакский р-н, окр. с. Верхний Каранай (Пономарёв, Халидов, 2007).

Zygiella montana (C.L.Koch, 1839). Дагестан: Магарамкентский р-н, долина р. Самур (Завадский А.М., 1902).

СЕМЕЙСТВО LYCOSIDAE

Род *Alopecosa* Simon, 1885 включает 104 вида. В Дагестане встречаются 5 видов:

Alopecosa accentuata (Latreille, 1817). Дагестан: 1 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева, Ахтынский р-н, с. Куруш (J.Buchar, K.Thaler, 1898). Чеченская республика: 1 ♀, с. Ведичи, июнь-июль 1990, Абдурахманов Г.М.

Alopecosa cronebergi (Thorell, 1875). Дагестан: Дербент (Thorell, 1875).

Alopecosa cuneata (Clerck, 1758) Дагестан: Буйнакский р-н, окр. с. Верхний Каранай (Пономарёв, Халидов, 2007).

Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757). Дагестан: 2 ♀, Цумадинский р-н, села Инхоквари, Хонох, Хварши, Июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов; 4 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева, Буйнакский р-н, окр. с. Эрпели (Пономарёв, Халидов, 2007). Чеченская республика: 2 ♀, с. Ведичи, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов.

Alopecosa sp. Дагестан: 1 ♀, Ахтынский р-н, июнь-июль 1991, с. Куруш, Абдурахманов Г.М.

Род *Allohogna* Roewer, 1955 включает 2 вида. В Дагестане встречается 1 вид:

Allohogna singoriensis (Lachmann, 1770). Дагестан: 1 ♀, Махачкала 2002, С.В. Алиева; 2 ♀, Махачкала 2004, С.В. Алиева.

Род *Hogna* Simon, 1885 включает 1 вид. В Дагестане встречается 1 вид:

Hogna radiata (Latreille, 1817). Дагестан: 1 ♀, Махачкала 2002, С.В. Алиева; 1 ♂, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева; 1 juv ♀ Дербентский р-н, с. Аглоби, июнь 2004, С.В. Алиева; 1 ♀, Махачкала 2005, С.В. Алиева.

Род *Lycosa* Latreille, 1804 включает 12 видов. В Дагестане встречается 1 вид:

Lycosa bergsoei (Thorell, 1875). Дагестан: Дербент (Thorell, 1875).

Род *Mustelicosa* Roewer, 1960 включает 2 вида. В Дагестане встречается 1 вид:



Mustelicos dimidiata (Thorell, 1875). Дагестан: 1 ♀, Унцукульский р-н, с. Майданское, июль 2002, С.В. Алиева; 8 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева, Буйнакский р-н, окр. с. Верхний Каранай (Пономарёв, Халидов, 2007).

Род *Pardosa* C.L.Koch, 1847 включает 102 вида. В Дагестане встречается 20 видов:

Pardosa agrestis (Westring, 1861). Дагестан: 2 ♂, 2 ♀, Ахтынский р-н, с. Куруш, июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов; 3 ♀, Чародинский р-н, с. Арчиб, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов; 1 ♀, Цумадинский р-н, села Инхоквари, Хонох, Хварши, Июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов; 1 ♀, Унцукульский р-н, с. Майданское, июль 2002, С.В. Алиева; 1 ♀, Махачкала 2002, С.В. Алиева; 1 ♀, Махачкала 2004, С.В. Алиева; 23 ♀, 5 ♂, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева, Буйнакский р-н, окр. с. Эрпели, с. Верхнее Казанище; окр. с. Верхний Каранай (Пономарёв, Халидов, 2007). Чеченская республика: 1 ♂, с. Итум-Кале, июль 1989, Абдурахманов Г.М.; 1 ♀, с. Ведичи, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов.

Pardosa amentata (Clerck, 1758). Чеченская республика: 1 ♀, с. Ведичи, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов.

Pardosa aquila Buchar et Thaler, 1998. Дагестан: 1 ♀, Цумадинский р-н, села Инхоквари, Хонох, Хварши, Июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов. Дагестан: Ахтынский р-н, с. Куруш, г. Шалбуздаг (Buchar, Thaler, 1898).

Pardosa bifasciata (C.L. Koch, 1836). Дагестан: 5 ♀, 7 ♂, Ахтынский р-н, с. Куруш, июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов. Буйнакский р-н, окр. с. Эрпели, окр. с. Верхний Каранай (Пономарёв, Халидов, 2007).

Pardosa buchar Ovtsharenko, 1979. Дагестан: 15 ♀, 6 ♂, Ахтынский р-н, с. Куруш, июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов; 5 ♀, Цумадинский р-н, села Инхоквари, Хонох, Хварши, Июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов; 4 ♀, Чародинский р-н, с. Арчиб, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов; 1 ♀, Магарамкентский р-н, Самурский лес, 5.06.1991, Г.М. Абдурахманов; 22 ♀, 1 ♂, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева, Ахтынский р-н, с. Куруш, г. Шалбуздаг (Buchar, Thaler, 1898). Чеченская республика: 1 ♀, с. Итум-Кале, июль 1989, Абдурахманов Г.М.; 2 ♀, 1 ♂, с. Ведичи, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов;

Pardosa caucasica Ovtsharenko, 1979. Дагестан: 1 ♂, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева. Буйнакский р-н, окр. с. Эрпели, с. Верхнее Казанище, окр. с. Верхний Каранай (Пономарёв, Халидов, 2007). Чеченская республика: 1 ♀, с. Ведичи, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов.

Pardosa dagestana Buchar et Thaler, 1998. Дагестан: Ахтынский р-н, с. Куруш, г. Шалбуздаг (Buchar, Thaler, 1898).

Pardosa ibex Buchar et Thaler, 1998. Дагестан: 1 ♀, Цумадинский р-н, села Инхоквари, Хонох, Хварши, Июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов, Ахтынский р-н, с. Куруш, г. Шалбуздаг (Buchar, Thaler, 1898).

Pardosa incerta Nosek, 1905. Дагестан: 1 ♀, Цумадинский р-н, села Инхоквари, Хонох, Хварши, Июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов; 5 ♀, Ахтынский р-н, с. Куруш, июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов; 2 ♀, Чародинский р-н, с. Арчиб, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов; 1 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева. Чеченская республика: 1 ♀, с. Итум-Кале, июль 1989, Г.М. Абдурахманов.

Pardosa italica Tongiorgi, 1966. Дагестан: Буйнакский р-н, окр. с. Верхний Каранай (Пономарёв, Халидов, 2007).

Pardosa hortensis (Thorell, 1872). Дагестан: Буйнакский р-н, с. Верхнее Казанище (Пономарёв, Халидов, 2007).

Pardosa nebulosa (Thorell, 1872). Дагестан: 1 ♀, Махачкала, 2004, С.В. Алиева, Дербент (Т. Thorell, 1875)

Pardosa paludicola (Clerck, 1758). Дагестан: 1 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева, Буйнакский р-н, окр. с. Эрпели (Пономарёв, Халидов, 2007). Чеченская республика: 1 ♀, с. Итум-Кале, июль 1989, Г.М. Абдурахманов.

Pardosa pirkuliensis Zyuzin et Logunov, 2000. Дагестан: 6 ♂, 2 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева. Чеченская республика: 2 ♀, с. Итум-Кале, июль 1989, Г.М. Абдурахманов.



Pardosa pontica (Thorell, 1875). Дагестан: 1 ♀, Унцукульский р-н, Ирганай сад, июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов. Чеченская республика: 1 ♀, с. Итум-Кале, июль 1989, Г.М. Абдурахманов.

Pardosa proxima (C.L.Koch, 1847). Дагестан: 1 ♀, Хивский район, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева.

Pardosa schenkeli Lessert, 1904. Дагестан: Ахтынский р-н, с. Куруш, г. Шалбуздаг (Buchar, Thaler, 1898)

Pardosa tatarica (Thorell, 1875). Дагестан: 1 ♂, 2 ♀, Цумадинский р-н, села Инхоквари, Хонох, Хварши, Июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов. 3 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева. Чеченская республика: 1 ♀, с. Ведичи, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов.

Pardosa tasevi Buchar, 1968. Дагестан: Буйнакский р-н, окр. с. Эрпели (Пономарёв, Халидов, 2007).

Pardosa vittata (Keyserling, 1863). Дагестан: 2 ♀, Ахтынский р-н, с. Куруш, июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов. 1 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева.

Pardosa sp. группы *monticola*. Дагестан: 1 ♂, 2 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева.

Род *Pirata* Sundevall, 1832 включает 15 видов. В Дагестане встречаются 2 вида:

Pirata knorri (Scopoli, 1763). Дагестан: 5 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева.

Pirata piraticus (Clerck, 1758). Дагестан: 1 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева.

Род *Tricca* Simon, 1889 включает 3 вида. В Дагестане встречается 1 вид:

Tricca lutetiana (Simon, 1876). Буйнакский р-н, окр. с. Эрпели (Пономарёв, Халидов, 2007).

Род *Trochosa* C.L.Koch, 1847 включает 9 видов. В Дагестане встречается 3 вида:

Trochosa robusta (Simon, 1876). Дагестан: 2 ♀, Махачкала 2002, С.В. Алиева; 1 ♀, Махачкала 2004, С.В. Алиева; 1 ♀, Махачкала 2005, С.В. Алиева, Буйнакский р-н, окр. с. Эрпели, окр. с. Верхний Каранай (Пономарёв, Халидов, 2007).

Trochosa ruricola (De Geer, 1778). Дагестан: 6 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева, Буйнакский р-н, окр. с. Эрпели (Пономарёв, Халидов, 2007). Чеченская республика: 1 ♀, с. Итум-Кале, июль 1989, Г.М. Абдурахманов.

Trochosa terricola Thorell, 1856. Дагестан: 1 ♀, Махачкала 2004, С.В. Алиева; 2 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева, Буйнакский р-н, окр. с. Эрпели, с. Верхнее Казанище, окр. с. Верхний Каранай (Пономарёв, Халидов, 2007). Чеченская республика: 2 ♀, с. Ведичи, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов.

Род *Xerolycosa* F.Dahl, 1908 включает 2 вида. В Дагестане встречаются 2 вида:

Xerolycosa miniata (C.L. Koch, 1834). Чеченская республика: 1 ♀, с. Итум-Кале, июль 1989, Г.М. Абдурахманов.

Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861). Дагестан. Буйнакский р-н, с. Верхнее Казанище, окр. с. Верхний Каранай (Пономарёв, Халидов, 2007).

СЕМЕЙСТВО PISAURIDAE

Род *Pisaura* Simon, 1885 включает 4 вида. В Дагестане встречается 1 вид:

Pisaura mirabilis (Clerck, 1758). Дагестан: 1 ♀, Ахтынский р-н, июнь-июль 1991, с. Куруш, Г.М. Абдурахманов; 2 ♀, Унцукульский р-н, с. Майданское, июль 2002, С.В. Алиева; 2 ♂, 2 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева; 1 ♀, Махачкала 2002, С.В. Алиева; 1 ♀, Махачкала 2004, С.В. Алиева; 1 ♀, Махачкала 2005, С.В. Алиева, Буйнакский р-н, окр. с. Эрпели, с. Верхнее Казанище, окр. с. Верхний Каранай (Пономарёв, Халидов, 2007).

СЕМЕЙСТВО AGELENIDAE

Род *Agelena* Walckenaer, 1805 включает 9 видов. В Дагестане встречается 1 вид:

Agelena labyrinthica (Clerck, 1758). Дагестан: 1 ♀, Ахтынский р-н, июнь-июль 1991, с. Куруш, Г.М. Абдурахманов; 12 ♀, 4 ♂, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева.



- Род *Tegenaria* Latreille, 1804 включает 17 видов. В Дагестане встречается 1 вид:
Tegenaria domestica (Clerck, 1758). Дагестан: 2 ♀, Махачкала, 2002, С.В. Алиева.
Tegenaria sp.. Дагестан: Буйнакский р-н, окр. с. Верхний Каранай (Пономарёв, Халидов, 2007).
- Род *Malthonica* Simon, 1898 включает 42 видов. В Дагестане встречается 1 вид:
Malthonica sp. Дагестан 3 ♀, Дербентский р-н, с. Аглоби, июнь 2004, С.В. Алиева, Буйнакский р-н, с. Верхнее Казанище, окр. с. Верхний Каранай (Пономарёв, Халидов, 2007).
- СЕМЕЙСТВО ARGYRONETIDAE
Род *Argyroneta* Latreille, 1804 включает 1 вид. В Дагестане встречается 1 вид:
Argyroneta aquatica (Clerck, 1758). Дагестан (С.Ю. Ибрагимов, 1975)
- СЕМЕЙСТВО DICTYNIDAE
Род *Lathys* Simon, 1889 включает 6 видов. В Дагестане встречается 1 вид:
Lathys humilis (Blackwall, 1855). Дагестан 1 ♀, Ахтынский р-н, июнь-июль 1991, с. Куруш, Г.М. Абдурахманов.
- СЕМЕЙСТВО AMAUROBIIDAE
Род *Coelotes* Blackwall, 1841 включает 12 видов. В Дагестане встречается 1 вид:
Coelotes sp. Дагестан 5 ♀, 1 ♂, Ахтынский р-н, июнь-июль 1991, с. Куруш, Г.М. Абдурахманов; 13 ♀, Чародинский р-н, с. Арчиб, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов; 39 ♀, 5 ♂, Цумадинский р-н, села Инхоквари, Хонох, Хварши, Июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов; 5 ♀, 3 ♂, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева.
- СЕМЕЙСТВО TITANOECIDAE
Род *Titanoeca* Thorell, 1869 включает 19 видов. В Дагестане встречается 1 вид:
Titanoeca sp. Дагестан: 1 ♀, Унцукульский район, с. Майданское, июль 2002, С.В. Алиева.
- СЕМЕЙСТВО OXYOPIDAE
Род *Oxyopes* Latreille, 1804 включает 8 видов. В Дагестане встречается 2 вида:
Oxyopes heterophthalmus (Latreille, 1804). Дагестан: 2 ♀, Унцукульский р-н, с. Майданское, июль 2002, С.В. Алиева.
Oxyopes lineatus Latreille, 1806. Дагестан: 3 ♀, Унцукульский р-н, с. Майданское, июль 2002, С.В. Алиева, Буйнакский р-н, окр. с. Эрпели (Пономарёв, Халидов, 2007).
- СЕМЕЙСТВО ANYPHAENIDAE
Род *Anypaena* Sundevall, 1833 включает 3 вида. В Дагестане встречается 1 вид:
Anypaena accentuata (Walckenaer, 1802). Дагестан: 1 ♀, Магарамкентский р-н, Самурский лес, 5.06.1991, Г.М. Абдурахманов; 1 ♀, Унцукульский р-н, Ирганай сад, июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов.
- СЕМЕЙСТВО LIOCRANIDAE
Род *Agroeca* Westring, 1861 включает 8 видов. В Дагестане встречается 1 вид:
Agroeca maculata L.Koch, 1879. Дагестан: 1 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева. Замечание. Ранее самая западная находка вида была зафиксирована в Западном Казахстане на Индерской возвышенности (Пономарёв, Цветков, 2004). Пономарёв А.В., Цветков А.С.
- Род *Phrurolithus* C.L.Koch, 1839 включает 5 видов. В Дагестане встречается 1 вид:
Phrurolithus festivus (C.L.Koch, 1835). Дагестан: Буйнакский р-н, окр. с. Эрпели (Пономарёв, Халидов, 2007).
- СЕМЕЙСТВО MITURGIDAE
Род *Cheiracanthium* C. L. Koch, 1839 включает 5 видов. В Дагестане встречаются 2 вида:
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802). Дагестан: Буйнакский р-н, с. Верхнее Казанище (Пономарёв, Халидов, 2007).
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864. Дагестан: 1 ♂, Махачкала, 2005, С.В. Алиева.
- СЕМЕЙСТВО CLUBIONIDAE
Род *Clubiona* Latreille, 1804 включает 87 видов. В Дагестане встречается 3 вида:
Clubiona golovatchi Michailov, 1990. Дагестан: Долина р. Чирагчай, Сардакент, Хив; долина р. Самур, Гарах (K.G. Mikhailov, 1990)
Clubiona lutescens Westring, 1851. Дагестан: долина р. Чирагчай, Хив (Mikhailov, 1990) Чеченская республика: 1 ♀, с. Ведичи, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов.



Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862. Дагестан: 1 ♂, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева, Долина р. Самур (K.G. Mikhailov, 1990).

СЕМЕЙСТВО GNAPHOSIDAE

Род *Drassodes* Westring, 1851 включает 30 видов. В Дагестане встречаются 6 видов:

Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802). Дагестан: 1 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева. Чеченская республика: 1 ♂, с. Ведичи, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов.

Drassodes lutescens (C.L.Koch, 1839). Дагестан: Буйнакский р-н, с. Верхнее Казанище (Пономарёв, Халидов, 2007).

Drassodes pubescens (Thorell, 1856). Дагестан: 1 ♀, Цумадинский р-н, села Инхоквари, Хонох, Хварши, Июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов.

Drassodes dagestanus **sp.n.** Дагестан: 3 ♂, 2 ♀, Ахтынский р-н, с. Куруш, июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов; 12 ♀, 1 ♂, Чародинский р-н, с. Арчиб, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов; 6 ♀, Цумадинский р-н, села Инхоквари, Хонох, Хварши, Июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов. Дополнительный материал. Чеченская республика: 2 ♀, с. Ведичи, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов. [5]

Drassodes sp.2. Дагестан: 2 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2004, С.В. Алиева.

Drassodes archibensis **sp.n.** Дагестан: 1 ♂, Чародинский р-н, с. Арчиб, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов. [5]

Род *Drassyllus* Chamberlin, 1922 включает 5 видов. В Дагестане встречаются 3 вида:

Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866). Дагестан: 2 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева.

Drassyllus pumilus (C.L.Koch, 1839). Дагестан: 1 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева.

Drassyllus pussillus (C.L.Koch, 1833). Дагестан: 1 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева.

Род *Gnaphosa* Latreille, 1804 включает 69 видов. В Дагестане встречаются 5 видов:

Gnaphosa leporina (L.Koch, 1866). Дагестан: 1 ♀, Чародинский р-н, с. Арчиб, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов; 2 ♀, Цумадинский р-н, села Инхоквари, Хонох, Хварши, Июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов.

Gnaphosa lugubris (C.L. Koch, 1839). Дагестан: 1 ♂, 10 ♀, Ахтынский р-н, с. Куруш, июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов; 7 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева.

Gnaphosa taurica Thorell, 1875. Дагестан: 1 ♀, Чародинский р-н, с. Арчиб, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов; 6 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева.

Gnaphosa sp.? группы *leporina*. Чеченская республика: 1 ♀, с. Итум-Кале, июль 1989, Г.М. Абдурахманов.

Gnaphosa sp.?. Дагестан: 1 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева.

Род *Haplodrassus* Chamberlin, 1922 включает 16 видов. В Дагестане встречается 1 вид:

Haplodrassus signifer (C.L.Koch, 1839). Дагестан: 1 ♂, 2 ♀, Ахтынский р-н, с. Куруш, июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов; 2 ♀, Чародинский р-н, с. Арчиб, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов; 2 ♀, Цумадинский р-н, села Инхоквари, Хонох, Хварши, июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов; 2 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева, Буйнакский р-н, окр. с. Верхний Каранай (Пономарёв, Халидов, 2007).

Род *Micaria* Westring, 1851 включает 27 видов. В Дагестане встречается 1 вид:

Micaria formicaria (Sundevall, 1831). Дагестан: 1 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2004, С.В. Алиева.

Род *Scotophaeus* Simon, 1893 включает 5 видов. В Дагестане встречается 1 вид:

Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866). Дагестан: 1 ♀, Махачкала, 2004. С.В. Алиева.

Род *Zelotes* Gistel, 1848 включает 49 видов. В Дагестане встречается 2 вида:



Zelotes latreillei (Simon, 1878). Дагестан: 1 ♀, Цумадинский р-н, села Инхоквари, Хонох, Хварши, Июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов.

Zelotes subterraneus (C.L.Koch, 1833). Дагестан: 2 ♀, Чародинский р-н, с. Арчиб, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов. Чеченская республика: 1 ♀, с. Итум-Кале, июль 1989, Г.М. Абдурахманов.

СЕМЕЙСТВО ZORIDAE

Род *Zora* C.L.Koch, 1847 включает 7 видов. В Дагестане встречаются 3 вида:

Zora armillata Simon, 1878. Дагестан: Буйнакский р-н, окр. с. Эрпели, окр. с. Верхний Каранай, (Пономарёв, Халидов, 2007).

Zora nemoralis (Blackwall, 1861). Дагестан: Буйнакский р-н, окр. с. Эрпели, с. Верхнее Казанище, окр. с. Верхний Каранай (Пономарёв, Халидов, 2007).

Zora spinimana (Sundevall, 1832). Дагестан: Буйнакский р-н, окр. с. Эрпели, с. Верхнее Казанище (Пономарёв, Халидов, 2007).

СЕМЕЙСТВО PHILODROMIDAE

Род *Philidromus* Walckenaer, 1826 включает 34 вида. В Дагестане встречается 3 вида:

Philidromus cespitum (Walckenaer, 1802). Дагестан: 1 ♀, Унцукульский район, с. Майданское, июль 2002, С.В. Алиева. Чеченская республика: 1 ♀, с. Ведичи, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов.

Philidromus dispar Walckenaer, 1826. Дагестан: 1 ♂, Магарамкентский р-н, Самурский лес, 5.06.1991, Г.М. Абдурахманов, Буйнакский р-н, окр. с. Верхний Каранай (Пономарёв, Халидов, 2007).

Philidromus margaritatus (Clerck, 1758). Чеченская республика: 1 ♀, с. Ведичи, июнь-июль 1990, Абдурахманов Г.М.

Род *Thanatus* C.L.Koch, 1837 включает 29 видов. В Дагестане встречается 1 вид:

Thanatus atratus Simon, 1875. Дагестан: 1 ♀, Ахтынский р-н, июнь-июль 1991, с. Куруш, Г.М. Абдурахманов.

Род *Tibellus* Simon, 1875 включает 8 видов. В Дагестане встречается 1 вид:

Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802). Буйнакский р-н, окр. с. Эрпели (Пономарёв, Халидов, 2007).

СЕМЕЙСТВО THOMISIDAE

Род *Ebrehtella* Dahl, 1907 включает 11 видов. В Дагестане встречается 1 вид:

Ebrehtella tricuspidata (Fabricius, 1775). Дагестан: 1 ♀, Унцукульский р-н, с. Майданское, июль 2002, С.В. Алиева; 1 ♀, Махачкала 2005, С.В. Алиева, Буйнакский р-н, окр. с. Эрпели, окр. с. Верхний Каранай (Пономарёв, Халидов, 2007). Чеченская республика: 2 ♀, с. Итум-Кале, июль 1989, Г.М. Абдурахманов; 2 ♀, с. Ведичи, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов.

Род *Misumena* Latreille, 1804 включает 2 вида. В Дагестане встречается 1 вид:

Misumena vatia (Clerck, 1758). Дагестан: 5 ♀, 1 ♂, Унцукульский р-н, с. Майданское, июль 2002, С.В. Алиева, Буйнакский р-н, окр. с. Верхний Каранай (Пономарёв, Халидов, 2007). Чеченская республика: 3 ♀, с. Итум-Кале, июль 1989, Г.М. Абдурахманов; 2 ♀, с. Ведичи, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов.

Род *Misumenops* O. Pickard-Cambridge, 1900 включает 4 вида. В Дагестане встречается 1 вид:

Misumenops tricuspidata (Fabricius, 1775). Дагестан: 1 ♀, Унцукульский р-н, с. Майданское, июль 2002, С.В. Алиева.

Род *Ozyptila* Simon, 1864 включает 24 вида. В Дагестане встречается 2 вида:

Ozyptila lugubris (Kroneberg, 1875). Дагестан: о. Чечень (С.И. Сигида, 2002)

Ozyptila orientalis Kulczynski, 1926. Дагестан: 1 ♀, Чародинский р-н, с. Арчиб, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов; 3 ♀, 1 ♂, Ахтынский р-н, июнь-июль 1991, с. Куруш, Г.М. Абдурахманов.

Род *Runcinia* Simon, 1875 включает 30 видов. В Дагестане встречается 1 вид:

Runcinia grammica (C. L. Koch, 1837). Дагестан: 1 ♀, Унцукульский р-н, с. Майданское, июль 2002, С.В. Алиева.

Род *Syneta* Simon, 1864 включает 6 видов. В Дагестане встречается 2 вида:



Synema globosum (Fabricius, 1775). Дагестан: 1 ♂, Унцукульский р-н, с. Майданское, июль 2002, С.В. Алиева; 3 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева, Буйнакский р-н, окр. с. Эрпели (Пономарёв, Халидов, 2007). Чеченская республика: 3 ♂, 2 ♀, с. Итум-Кале, июль 1989, Г.М. Абдурахманов; 7 ♂, 10 ♀, с. Ведичи, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов.

Synema plorator (O. Pickard-Cambridge, 1872). Дагестан: 1 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2004, С.В. Алиева.

Род *Thomisus* Walckenaer, 1805 включает 2 вида. В Дагестане встречается 1 вид:

Thomisus onustus Walckenaer, 1805. Дагестан: 2 ♀, Унцукульский р-н, с. Майданское, июль 2002, С.В. Алиева; 3 ♀, 1 ♂, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева.

Род *Tmarus* Simon, 1875 включает 6 видов. В Дагестане встречается 1 вид:

Tmarus piger (Walckenaer, 1802). Дагестан: 1 ♀, Магарамкентский р-н, Самурский лес, 5.06.1991, Г.М. Абдурахманов.

Род *Xysticus* C.L.Koch, 1835 включает 107 видов. В Дагестане встречается 10 видов:

Xysticus atevi Ovtsharenko, 1979л. Дагестан: 1 ♂, Чародинский р-н, с. Арчиб, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов.

Xysticus bacurianensis Mcheidze, 1971. Дагестан: 1 ♀, Ахтынский р-н, с. Куруш, июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов; 7 ♀, Чародинский р-н, с. Арчиб, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов; 2 ♀, Цумадинский р-н, села Инхоквари, Хонох, Хварши, июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов.

Xysticus bifasciatus C.L.Koch, 1837. Дагестан: 1 ♂, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева. Чеченская республика: 3 ♀, 2 ♂ с. Ведичи, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов.

Xysticus crisratus (Clerck, 1758). Дагестан: 1 ♀, Ахтынский р-н, с. Куруш, июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов. Чеченская республика: 1 ♀, с. Итум-Кале, июль 1989, Г.М. Абдурахманов; 3 ♀, 6 ♂, с. Ведичи, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов.

Xysticus gallicus Simon, 1875. Дагестан: 2 ♀, Ахтынский р-н, с. Куруш, июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов; 2 ♀, Чародинский р-н, с. Арчиб, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов; 2 ♀, Цумадинский р-н, села Инхоквари, Хонох, Хварши, июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов.

Xysticus umbrinus Utotschkin, 1968. Чеченская республика: 2 ♂, 2 ♀, с. Ведичи, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов.

Xysticus ninnii (Thorell, 1872). Дагестан: 2 ♂, Ахтынский р-н, с. Куруш, июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов. Чеченская республика: 1 ♂, с. Ведичи, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов.

Xysticus robustus (Hahn, 1832). Дагестан: 3 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева.

Xysticus soderbomi Schenkel, 1936. Дагестан: 1 ♀, Ахтынский р-н, с. Куруш, июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов; 1 ♀, Унцукульский р-н, с. Майданское, июль 2002, С.В. Алиева.

Xysticus kochi Thorell, 1872. Дагестан: 5 ♀, Унцукульский р-н, с. Майданское, июль 2002, С.В. Алиева; 1 ♂, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева; 2 ♀, Дербентский район, с. Аглоби, июнь 2004, С.В. Алиева, Буйнакский р-н, с. Верхнее Казанище, окр. с. Верхний Каранай (Пономарёв, Халидов, 2007). Чеченская республика: 1 ♂, с. Итум-Кале, июль 1989, Г.М. Абдурахманов; 1 ♀, с. Ведичи, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов.

СЕМЕЙСТВО SALTICIDAE

Род *Cyrbia* Simon, 1876 включает 2 вида. В Дагестане встречается 1 вид:

Cyrbia algerina (Lucas, 1846). Дагестан: Дербент (Logunov, Guseinov, 2002)

Род *Evarcha* Simon, 1902 включает 7 видов. В Дагестане встречается 1 вид:

Evarcha arcuata (Clerck, 1758). Дагестан: Буйнакский р-н, окр. с. Эрпели (Пономарёв, Халидов, 2007). Чеченская республика: 1 ♂, с. Ведичи, июнь-июль 1990, Абдурахманов Г.М.

Род *Heliophanus* C.L.Koch, 1833 включает 27 видов. В Дагестане встречается 2 вида:

Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802). Дагестан: Южный Дагестан (Rakov, Logunov, 1997)

Heliophanus mordax (O. Pickard-Cambridge, 1872). Дагестан: Дербент (D.V. Logunov, E.F. Guseinov, 2002); Кизилюрт, (S. Yu. Rakov, D.V. Logunov, 1997)



- Род *Macaroeris* Wunderlich, 1992 включает 9 видов. В Дагестане встречается 1 вид:
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802). Дагестан: Дербент (Logunov, Guseinov, 2002).
- Род *Mogrus* Simon, 1882 включает 5 видов. В Дагестане встречается 1 вид:
Mogrus neglectus (Simon, 1868). Дагестан: Дербент (Logunov, Guseinov, 2002).
- Род *Neon* Simon, 1876 включает 5 видов. В Дагестане встречается 1 вид:
Neon rayi (Simon, 1875). Дагестан: Сергокала (Logunov, Guseinov, 2002).
- Род *Pellenes* Simon, 1876 включает 20 видов. В Дагестане встречается 1 вид:
Pellenes turkmenicus Logunov, Marusik et Rakov, 1999. Дагестан: Дербент (Logunov, Marusik, Rakov, 1999)
- Род *Philaeus* Thorell, 1869 включает 2 вида. В Дагестане встречается 1 вид:
Philaeus chrysops (Poda, 1761). Дагестан: 1 ♂, Унцукульский р-н, Ирганай сад, июнь-июль 1991 Г.М. Абдурахманов; 1 ♂, Махачкала 2005, С.В. Алиева, Дербент (Logunov, Guseinov, 2002).
- Род *Phlegra* Simon, 1876 включает 5 видов. В Дагестане встречается 1 вид:
Phlegra cinereofasciata Simon, 1868. Дагестан: Дербент (Logunov, Guseinov, 1876; Azarkina, 2002)
- Род *Pseudicius* Simon, 1885 включает 7 видов. В Дагестане встречается 1 вид:
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802). Дагестан: 1 ♀, Дербентский р-н, село Аглоби, июнь 2004, Алиева С.В.
- Род *Pseudeuophrys* Dahl, 1912 включает 8 видов. В Дагестане встречается 2 вида:
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826). Дагестан: Буйнакский р-н, с. Верхнее Казанище, окр. с. Верхний Каранай (Пономарёв, Халидов, 2007).
- Pseudeuophrys lanigera* (Simon, 1871). Дагестан: 1 ♂, Ахтынский р-н, с. Куруш, июнь-июль 1991, Абдурахманов Г.М. Замечание. Новый вид для фауны России. Известен из Грузии, Болгарии.
- Род *Salticus* Latreille, 1804 включает 9 видов. В Дагестане встречается 1 вид:
Salticus tricinctus (C.L.Koch, 1846). Буйнакский р-н, с. Верхнее Казанище, 9.06.2006 (Пономарёв, Халидов, 2007).

Библиографический список

1. Ажеганова Н.С. Краткий определитель пауков. – Ленинград, 1968. – 152 с.
2. Пономарев А.В., А.Х.Халидов. К фауне пауков (Aranei) Дагестана. // Вестник Южного Научного Центр РАН. 2007.- Том 3. № 2. стр. 72-78.
3. Михайлов К.Г. Каталог пауков территорий бывшего СССР. - Москва. - 1997.
4. Танаевич А.В. Пауки семейства Linyphidae фауны Кавказа. // Фауна наземных беспозвоночных Кавказа. Сборник научных трудов. Академия Наук СССР. – М.: «Наука». 1990.
5. Пономарев А.В., Алиева С.В. Новые виды пауков рода *Drassodes* Westring, 1851 (Aranei: Gnaphosidae) из Дагестана. Кавказский Энтомологический бюллетень, Ростов-на-Дону РАН Южный Научный Центр. 2008. том 4, выпуск 3 – стр.255-257.

УДК 574.55 (262.81)

ДИНАМИКА УЛОВОВ И ЗАПАСОВ ТЮЛЕК КАСПИЙСКОГО МОРЯ

© 2009. **Иванов В.П., Зыков Л.А.**

Астраханский государственный технический университет

В статье приводятся многолетние данные о запасах и уловах каспийских тюлек (килек).